

Čimbenici koji utječu na liječenje statinima



Oko 40 % bolesnika oklijeva započeti liječenje statinima.



ERIN D. MICHOS, dr. med.
profesorica medicine,
Sveučilište Johns Hopkins

Informacije s interneta i iz medija često stvaraju nepovjerenje prema statinima.



Manji broj bolesnika može razviti nuspojave povezane sa statinima, poput:



bolova ili slabosti mišića



povišene razine šećera u krvi



Zbog tih tegoba neki bolesnici prestaju uzimati statine prema propisanom režimu.

Ponekad sumnja da će dobiti nuspojave statina može dovesti do prividnog osjećaja da se doista radi o nuspojavama.


Taj se fenomen naziva „nocebo efekt.“



Postoje stvarni ozbiljni rizici povezani s neuzimanjem statina, odnosno smanjenom redovitošću uzimanja statina:



nepovoljni zdravstveni ishodi, poput srčanog i moždanog udara



učestalije potrebe za bolničkim liječenjem



povećani troškovi zdravstvene skrbi



Bolesnici s visokim rizikom za bolesti srca i krvnih žila koji ne uzimaju statine, bez obzira na razlog, trebaju druge učinkovite oblike liječenja povećanih masnoća u krvi.



INTERNATIONAL
ATHEROSCLEROSIS
SOCIETY

